

2026년도 상반기 수산용 동물용의약(외)품 품목 허가·변경 현황

구분	제품명	효능 및 효과	용법 및 용량	유효 성분량	업 체 명 휴약기간	비 고
항생· 항균제	수산용 OTC 프라임 500 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	우진비앤지(주) 송어·메기·뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	허가
	수산용 아목시실린 주 (아목시실린 수화물)	○ 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -넙치:연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> , <i>S. iniae</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>)	○ 주사 -어체중 kg당 0.2mL(억가 30mg)를 단회 등근육 주사	150mg /mL	(주)삼양애니팜 넙치 119일	허가
	수산용 참신 에리스로 200 (에리스로마이신 티오시아네이트)	○ 에리스로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -무지개송어: 연쇄구균증(<i>Streptococcus sp.</i>) -방어: 연쇄구균증(<i>Lactococcus garvieae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 125~200g/일(억가 25~40g)으로 1일 1회 5일 투여	200g /kg	(주)참신홀딩스 무지개송어 30일 방어 14일	허가
	아쿠아 타일설파산 (타일로신 타르타르산+ 설파모노메톡시나트륨)	○ 타일로신, 설파모노메톡신 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -넙치: 연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> , <i>S. iniae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 100g(타일로신_8g, 설파모노메톡신_32g) 1일 1회, 3일 투여	80g(억가) +320g /kg	대한뉴팜(주) 넙치 25일	허가
	B.K 오토시 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	보국(주) 송어·메기·뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경

	GD-옥시 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 42~208g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 230~345g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 125~292g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 208~417g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 345g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 417g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 104g으로 30~60분 투여	240g /kg	㈜우성양행 송어·메기· 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
항생· 항균제	네옥시 마린 산 (옥시테트라사이클린염산염+네오마이신황산염)	○ 옥시테트라사이클린 및 네오마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -뱅장어: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -넙치: 연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -참돔: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -송어: 에어로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -미꾸라지: 에어로모나스병(<i>Aeromonas hydrophila</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당 -뱅장어: 40~80g(OTC 10.8~21.6g, NEO 7.2~14.4g)으로 1일 1회, 7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔: 160g(OTC 43.2g, NEO 28.8g)으로 1일 1회, 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -뱅장어: 50~100g(OTC 9~18g, NEO 6~12g)으로 1일 1시간, 7일 투여 -송어·미꾸라지: 200g(OTC 36g, NEO 24g)으로 1일 1시간, 7일 투여	270g+180g /kg	㈜삼우메디안 [경구투여] 뱅장어 30일 넙치 63일 조피볼락 66일 참돔 42일 [약욕] 뱅장어 30일 송어 14일 미꾸라지 46일	변경
	네옥시 아쿠아 산 (옥시테트라사이클린염산염+네오마이신황산염)	○ 옥시테트라사이클린 및 네오마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -뱅장어: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -넙치: 연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -참돔: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -송어: 에어로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -미꾸라지: 에어로모나스병(<i>Aeromonas hydrophila</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당 -뱅장어: 60~120g(OTC 10.8~21.6g, NEO 7.2~14.4g)으로 1일 1회, 7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔: 240g(OTC 43.2g, NEO 28.8g)으로 1일 1회, 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -뱅장어: 50~100g(OTC 9~18g, NEO 6~12g)으로 1일 1시간, 7일 투여 -송어·미꾸라지: 200g(OTC 36g, NEO 24g)으로 1일 1시간, 7일 투여	180g+120g /kg	㈜삼우메디안 [경구투여] 뱅장어 30일 넙치 63일 조피볼락 66일 참돔 42일 [약욕] 뱅장어 30일 송어 14일 미꾸라지 46일	변경
	발-오티시 250 수산용 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 40~200g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 220~331g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 120~280g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 200~400g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 331g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 400g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 100g으로 30~60분 투여	250g /kg	㈜넬바이오텍 송어·메기· 뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경

항생 · 항균제	벌-오티시 500 수산용 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병 (<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병 (<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증 (<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어: 지느러미적병 (<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병 (<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병 (<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어 (지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	(주)넬바이오텍 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	다원 오티씨 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병 (<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병 (<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증 (<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어: 지느러미적병 (<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병 (<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병 (<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어 (지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 40~200g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 220~331g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 120~280g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 200~400g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 331g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 400g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 100g으로 30~60분 투여	250g /kg	(주)다원케미칼 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	다원 오티씨 50% (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병 (<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병 (<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증 (<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어: 지느러미적병 (<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병 (<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병 (<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어 (지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	(주)다원케미칼 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	대성 아쿠아 오티씨 산 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병 (<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병 (<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어 (지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 33~167g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증),	300g /kg	(주)대성미생물연구소 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일	변경

항생 · 항균제		(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 184~276g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 100~233g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 167~333g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 276g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 333g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 83g으로 30~60분 투여		조피볼락 66일 참돔 20일 (약육 5일)	
	마하마이신 수산용 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 42~208g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 230~345g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 125~232g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 208~417g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 345g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 417g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 104g으로 30~60분 투여	240g /kg	쭉고려비엔피 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약육 5일)	변경
	빅솔 수산용 네옥스 (옥시테트라사이클린염산염+네오마이신염산염)	○ 옥시테트라사이클린 및 네오마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -뱅장어: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -넙치: 연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -참돔: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -송어: 에어로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -미꾸라지: 에어로모나스병(<i>Aeromonas hydrophila</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당 -뱅장어: 60~120g(OTC 10.8~21.6g, NEO 7.2~14.4g)으로 1일 1회, 7일 투여 -넙치 · 조피볼락 · 참돔: 240g(OTC 43.2g, NEO 28.8g)으로 1일 1회, 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -뱅장어: 50~100g(OTC 9~18g, NEO 6~12g)으로 1일 1시간, 7일 투여 -송어 · 미꾸라지: 200g(OTC 36g, NEO 24g)으로 1일 1시간, 7일 투여	180g+120g /kg	쭉솔튼바이오클 [경구투여] 뱅장어 30일 넙치 63일 조피볼락 66일 참돔 42일 [약육] 뱅장어 30일 송어 14일 미꾸라지 46일	변경
	빅솔 수산용 오티씨 250 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 40~200g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 220~331g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 120~280g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 200~400g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 331g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 400g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 100g으로 30~60분 투여	250g /kg	쭉솔튼바이오클 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약육 5일)	변경

항생· 항균제	빅솔 수산용 옥시펜타 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	(주)솔톤바이오켄 송어·메기·뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	수산용 OTC 고농도 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 40~200g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 220~331g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 120~280g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 200~400g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 331g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 400g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 100g으로 30~60분 투여	250g /kg	우진비앤지(주) 송어·메기·뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	수산용 네오테트라 (옥시테트라사이클린염산염+네오마이신염산염)	○ 옥시테트라사이클린 및 네오마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -뱅장어: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -넙치: 연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -참돔: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -송어: 에어로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -미꾸라지: 에어로모나스병(<i>Aeromonas hydrophila</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당 -뱅장어: 60~120g(OTC 10.8~21.6g, NEO 7.2~14.4g)으로 1일 1회, 7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔: 240g(OTC 43.2g, NEO 28.8g)으로 1일 1회, 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -뱅장어: 50~100g(OTC 9~18g, NEO 6~12g)으로 1일 1시간, 7일 투여 -송어·미꾸라지: 200g(OTC 36g, NEO 24g)으로 1일 1시간, 7일 투여	180g+120g /kg	(주)유니바이오테크 [경구투여] 뱅장어 30일 넙치 63일 조피볼락 66일 참돔 42일 [약욕] 뱅장어 30일 송어 14일 미꾸라지 46일	변경
	수산용 녹수테트라산-200 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 50~250g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 276~414g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 150~350g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 250~500g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 414g으로 10일 투여	200g /kg	녹십자수의약품(주) 송어·메기·뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경

항생 · 항균제		-잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	-조피볼락(비브리오병): 500g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 125g으로 30~60분 투여			
	수산용 녹수테트라산-500 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증), 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	녹십자수의약품(주) 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약육 5일)	변경
	수산용 리폭시네오 (옥시테트라사이클린염산염+네오마이신염산염)	○ 옥시테트라사이클린 및 네오마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -뱅장어: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -넙치: 연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -참돔: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -송어: 에어로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -미꾸라지: 에어로모나스병(<i>Aeromonas hydrophila</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당 -뱅장어: 60~120g(OTC 10.8~21.6g, NEO 7.2~14.4g)으로 1일 1회, 7일 투여 -넙치 · 조피볼락 · 참돔: 240g(OTC 43.2g, NEO 28.8g)으로 1일 1회, 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -뱅장어: 50~100g(OTC 9~18g, NEO 6~12g)으로 1일 1시간, 7일 투여 -송어 · 미꾸라지: 200g(OTC 36g, NEO 24g)으로 1일 1시간, 7일 투여	180g+120g /kg	우진비앤지(주) [경구투여] 뱀장어 30일 넙치 63일 조피볼락 66일 참돔 42일 [약육] 뱀장어 30일 송어 14일 미꾸라지 46일	변경
	수산용 삼양 오.티.씨 24산 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 42~208g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증), 슈도모나스병): 230~345g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 125~232g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 208~417g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 345g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 417g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 104g으로 30~60분 투여	240g /kg	(주)삼양애니팜 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약육 5일)	변경
	수산용 삼양 오.티.씨 480산 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 21~104g으로 3~7일 투여	480g /kg	(주)삼양애니팜 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일	변경

항생 · 항균제		(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	-메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 115~172g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 63~146g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 104~208g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 172g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 208g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 52g으로 30~60분 투여		방어 20일 조 피볼락 66일 참 돔 20일 (약욕 5일)	
	수산용 슈퍼 오티씨산 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료 혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 40~200g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 220~331g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 120~280g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 200~400g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 331g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 400g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 100g으로 30~60분 투여	250g /kg	㈜중앙바이오텍 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조 피볼락 66일 참 돔 20일 (약욕 5일)	변경
	수산용 슈퍼 오티씨산-500 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료 혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	㈜중앙바이오텍 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조 피볼락 66일 참 돔 20일 (약욕 5일)	변경
	수산용 애드 오티씨 500 산 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료 혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여	500g /kg	㈜애드바이오텍 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조 피볼락 66일 참 돔 20일 (약욕 5일)	변경

항생 · 항균제		-뱀장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	-송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여			
	수산용 애드 옥시네오산 (옥시테트라사이 클린염산염+네오 마이신황산염)	○ 옥시테트라사이클린 및 네오마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -뱀장어: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -넙치: 연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -참돔: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -송어: 에어로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -미꾸라지: 에어로모나스병(<i>Aeromonas hydrophila</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당 -뱀장어: 60~120g(OTC 10.8~21.6g, NEO 7.2~14.4g)으로 1일 1회, 7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔: 240g(OTC 43.2g, NEO 28.8g)으로 1일 1회, 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -뱀장어: 50~100g(OTC 9~18g, NEO 6~12g) 으로 1일 1시간, 7일 투여 -송어·미꾸라지: 200g(OTC 36g, NEO 24g) 으로 1일 1시간, 7일 투여	180g+120g /kg	(주)애드바이오텍 [경구투여] 뱀장어 30일 넙치 63일 조피볼락 66일 참돔 42일 [약욕] 뱀장어 30일 송어 14일 미꾸라지 46일	변경
	수산용 오티네오 산 (옥시테트라사이 클린염산염+네오 마이신황산염)	○ 옥시테트라사이클린 및 네오마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -뱀장어: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -넙치: 연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -참돔: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -송어: 에어로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -미꾸라지: 에어로모나스병(<i>Aeromonas hydrophila</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당 -뱀장어: 60~120g(OTC 10.8~21.6g, NEO 7.2~14.4g)으로 1일 1회, 7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔: 240g(OTC 43.2g, NEO 28.8g)으로 1일 1회, 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -뱀장어: 50~100g(OTC 9~18g, NEO 6~12g) 으로 1일 1시간, 7일 투여 -송어·미꾸라지: 200g(OTC 36g, NEO 24g) 으로 1일 1시간, 7일 투여	180g+120g /kg	(주)상양애니팜 [경구투여] 뱀장어 30일 넙치 63일 조피볼락 66일 참돔 42일 [약욕] 뱀장어 30일 송어 14일 미꾸라지 46일	변경
	수산용 오티씨 250 (옥시테트라사 이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscium</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료 혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 40~200g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증), 슈도모나스병: 220~331g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 120~280g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 200~400g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 331g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 400g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 100g으로 30~60분 투여	250g /kg	이화팜텍(주) 송어·메기· 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	수산용 타이로 200산 (타일로신산타 르타르산염)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치: 연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i> S. <i>iniae</i>) -강도다리: 연쇄구균증(<i>S. parauberis</i>) -조피볼락: 연쇄구균증(<i>Streptococcus iniae</i>)	○ 경구 -어체중 톤 당 50g(역가 10g) 1일 1회, 5일간 투여	200g(역가) /kg	(주)중앙바이오텍 넙치 20일 강도다리·조피볼락 28일	변경
	펜콜 아쿠아 주 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 연쇄구균증(<i>Streptococcus iniae</i> , <i>S. parauberis</i>), 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 주사 -어체중 kg당 본제 0.2ml(역가 10mg)를 1일 1회 근육 주사	50.0mg /mL	(주)고려비엔피 넙치 30일	변경

항생· 항균제	수산용 오티씨 고농도-500 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g(역가) /kg	에스비신일(주) 송어·메기· 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	수산용 옥사-50 아쿠아 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	㈜삼우메디안 송어·메기· 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	수산용 옥시네오산 (옥시테트라사이클린염산염+네오마이신염산염)	○ 옥시테트라사이클린 및 네오마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -뱀장어: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -넙치: 연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -참돔: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -송어: 에어로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -미꾸라지: 에어로모나스병(<i>Aeromonas hydrophila</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당 -뱀장어: 60~120g(OTC 10.8~21.6g, NEO 7.2~14.4g)으로 1일 1회, 7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔: 240g(OTC 43.2g, NEO 28.8g)으로 1일 1회, 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -뱀장어: 50~100g(OTC 9~18g, NEO 6~12g)으로 1일 1시간, 7일 투여 -송어·미꾸라지: 200g(OTC 36g, NEO 24g)으로 1일 1시간, 7일 투여	180g+120g /kg	㈜서울신약 [경구투여] 뱀장어 30일 넙치 63일 조피볼락 66일 참돔 42일 [약욕] 뱀장어 30일 송어 14일 미꾸라지 46일	변경
	수산용 옥시마이신 아쿠아 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 42~208g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 230~345g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 125~232g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 208~417g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 345g으로 10일 투여	240g /kg	㈜삼우메디안 송어·메기· 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경

항생 · 항균제		-잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	-조피볼락(비브리오병): 417g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 104g으로 30~60분 투여			
	수산용 옥시테라산 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료 혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	(주)한풍산업 송어·메기· 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약육 5일)	변경
	수산용 옥타폰 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료 혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 40~200g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 220~331g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 120~280g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 200~400g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 331g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 400g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 100g으로 30~60분 투여	250g /kg	(주)퓨오바이더스 송어·메기· 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약육 5일)	변경
	수산용 옥타폰 500 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료 혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	(주)퓨오바이더스 송어·메기· 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약육 5일)	변경

항생 · 항균제	아쿠아 오티씨 고농도 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병 (<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병 (<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증 (<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병 (<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병 (<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병 (<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어 (지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 42~208g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 230~345g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 125~232g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 208~417g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 345g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 417g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 104g으로 30~60분 투여	240g /kg	(주)서울신약 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	아쿠아 오티씨 업 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병 (<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병 (<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증 (<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병 (<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병 (<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병 (<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어 (지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 29~143g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 157~236g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 86~200g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 143~286g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 236g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 286g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 71g으로 30~60분 투여	350g /kg	(주)서울신약 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	옥시맥스500 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병 (<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병 (<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어: 유결절증 (<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병 (<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병 (<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔: 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병 (<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어 (지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	(주)아이애펜 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	월로마린 유한 오티씨 500 수용산 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어: 아가미부식병 (<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병 (<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병 (<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어 (지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여	500g /kg	이화팜텍(주) 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일	변경

항생 · 항균제	이클린염산염)	(<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	-메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여		방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	
	이화 수산용-오티씨 300 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 33~167g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 184~276g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 100~233g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 167~333g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 276g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 333g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 83g으로 30~60분 투여	300g /kg	이화팜텍㈜ 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	이화 수산용-오티씨 480 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱀장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas sp.</i>) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 21~104g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 115~172g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 63~146g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 104~208g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 172g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 208g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 52g으로 30~60분 투여	480g /kg	이화팜텍㈜ 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	진우 수산용 오티씨300 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어 · 연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas sp.</i>) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 33~167g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 184~276g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 100~233g으로 5일 투여	300g /kg	진우약품㈜ 송어 · 메기 · 뱀장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경

항생· 항균제		<i>piscicida</i>) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	-잉어(솔방울병): 167~333g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 276g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 333g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 83g으로 30~60분 투여			
	진우 수산용 오티씨-500 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	진우약품㈜ 송어·메기· 뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	진우 오티씨-250 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 40~200g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 220~331g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 120~280g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 200~400g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 331g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 400g으로 7일 투여 ○ 약욕: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 100g으로 30~60분 투여	250g /kg	진우약품㈜ 송어·메기· 뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경
	푸른바다 오티신 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병 (<i>Hemophilus piscum</i>), 세균성출혈성패혈증 (<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병 (<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱀장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 40~200g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 220~331g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 120~280g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 200~400g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 331g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 400g으로 7일 투여	250g /kg	제이비바이오팜㈜ 송어·메기· 뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약욕 5일)	변경

항생 · 항균제		-메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 100g으로 30~60분 투여			
	하이네옥시 (옥시테트라사이클린염+네오마이신황산염)	○ 옥시테트라사이클린 및 네오마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -뱅장어: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -넙치: 연쇄구균증(<i>Streptococcus parauberis</i>), 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -조피볼락: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -참돔: 에드워드병(<i>Edwardsiella piscicida</i>) -송어: 에어로모나스병(<i>Aeromonas salmonicida</i>) -미꾸라지: 에어로모나스병(<i>Aeromonas hydrophila</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당 -뱅장어: 60~120g(OTC 10.8~21.6g, NEO 7.2~14.4g)으로 1일 1회, 7일 투여 -넙치·조피볼락·참돔: 240g(OTC 43.2g, NEO 28.8g)으로 1일 1회, 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -뱅장어: 50~100g(OTC 9~18g, NEO 6~12g)으로 1일 1시간, 7일 투여 -송어·미꾸라지: 200g(OTC 36g, NEO 24g)으로 1일 1시간, 7일 투여	180g+120g /kg	(주)다원케미칼 [경구투여] 뱅장어 30일 넙치 63일 조피볼락 66일 참돔 42일 [약육] 뱅장어 30일 송어 14일 미꾸라지 46일	변경
	하이데라 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscium</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱅장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	한국쌍벚(주) 송어·메기·뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약육 5일)	변경
	휘쉬 옥시-500 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscium</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어: 유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어: 지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기: 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱅장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	(주)유니바이오테크 송어·메기·뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약육 5일)	변경
	휘쉬-옥시파워 (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어: 아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscium</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔: 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락: 비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱅장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 42~208g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증)	240g /kg	(주)유니바이오테크 송어·메기·뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일	변경

항생· 항균제		(<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	슈도모나스병): 230~345g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 125~232g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 208~417g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 345g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 417g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 104g으로 30~60분 투여		참돔 20일 (약육 5일)	
	히트마이신-24 (수산용) (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscium</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱅장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 42~208g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 230~345g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 125~232g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 208~417g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 345g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 417g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 104g으로 30~60분 투여	240g /kg	(주)한동 송어·메기· 뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약육 5일)	변경
	히트마이신-50 (수산용) (옥시테트라사이클린염산염)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어·연어:아가미부식병(<i>Flavobacterium columnare</i>), 비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 절창병(<i>Aeromonas salmonicida</i>), 궤양병(<i>Hemophilus piscium</i>), 세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -방어:유결절증(<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>piscicida</i>) -뱅장어:지느러미적병(<i>Aeromonas punctata</i>) -잉어:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>), 솔방울병(<i>Aeromonas hydrophila</i>) -메기:세균성출혈성패혈증(<i>Aeromonas liquefaciens</i>), 슈도모나스병(<i>Pseudomonas</i> sp.) -참돔:비브리오병(<i>Vibrio anguillarum</i>) -조피볼락:비브리오병(<i>Vibrio harveyi</i>)	○ 경구: 어체중 톤 당, 사료혼합 -참돔(비브리오병), 뱅장어(지느러미적병), 잉어(비브리오병), 송어(비브리오병): 20~100g으로 3~7일 투여 -메기(슈도모나스증, 세균성출혈성패혈증), 송어(절창병, 궤양병, 세균성출혈성패혈증, 슈도모나스병): 110~165g으로 10일 투여 -방어(유결절증): 60~140g으로 5일 투여 -잉어(솔방울병): 100~200g으로 5일 투여 -송어(아가미부식병): 165g으로 10일 투여 -조피볼락(비브리오병): 200g으로 7일 투여 ○ 약육: 물 톤당 -참돔(비브리오병): 50g으로 30~60분 투여	500g /kg	(주)한동 송어·메기· 뱅장어 30일 잉어 25일 방어 20일 조피볼락 66일 참돔 20일 (약육 5일)	변경
구충제	비지놀 과립(수산용) (비치오놀)	○ 비치오놀에 감수성이 있는 기생충성 질병의 치료 -뱅장어: <i>Trichodina</i> sp. 기생충의 구제	○ 경구 -2g/어체중 100kg, 1~3일	800g /kg	(주)한동 뱅장어 28일	변경
	아쿠아 프란텔 (프라지관텔)	○ 프라지관텔 기생충 질병 치료 -조피볼락: 아가미흡충증(<i>Microcotyle sebastis</i>)	○ 경구 -200~400g(역가 100~200g)/어체중 톤 당, 2일 간격, 1~3회 ○ 약육 -100~200g(역가 50~100g)/사육수 톤 당, 4분	500g /kg	대한뉴팜(주) 조피볼락 10일	변경

구충제	후마길 씨 (후마갈린)	○ 후마갈린에 감수성이 있는 기생충성 질병의 치료 -잉어(<i>Sphaerospora renicola</i> , <i>Myxobolus cyprini</i>) -뱅장어(<i>Pleistophora giardi</i> , <i>M. giardi</i>) -송어(<i>Sphaerospora</i> sp., <i>M. cerebralis</i>)	○ 경구 -300g~1kg/어체중 톤, 30일 투여 * 증세에 따라 투여량 가감 사용	50g(역가) /kg	(주)유니바이오테크 잉어·송어 14일 뱅장어 28일	변경
백신	힘백 어질방 S-3 플러스	○ 넙치의 연쇄구균증 <i>S. iniae</i> , <i>S. parauberis</i> 감염증의 예방 -면역지속기간: 6개월	○ 주사 -넙치(체중 35~500g): 0.1mL 씩 가슴지느러미와 배지느러미 사이 복강 접종	부표참조	(주)고려비엔피 -	변경
대사· 소화기계 작용약	우루소골드 아쿠아 (판토퓌산염 등)	○ 어류의 간기능 강화와 비타민 결핍증의 예방 및 치료	○ 경구 -어체중 1kg당 1일량으로 본제 1~2g을 사료에 혼합 투여	-	(주)아이애파 -	허가
	수산용 바이오씨 (아스코르브산 등)	○ 물고기, 새우 등 양식어류(넙치, 우럭, 참돔, 줄돔 등)의 비타민 C 결핍증 예방 및 치료, 면역력 증강, 스트레스 감소, 성장 촉진 및 사료효율 개선	○ 경구 -새우: 1.25~2.5kg/사료 톤 -잉어, 송어, 뱅장어, 메기, 연어: 0.75~1.25kg/사료 톤 -틸라피아(역돔), 넙치: 0.5~1.25kg/사료 톤	200g /kg	대한뉴팜(주) -	변경
	수산용 타이탄 주 (부타포스판 등)	○ 넙치: 증체개선, 성장촉진, 활력촉진, 스트레스 감소 및 면역증강	○ 주사 -어체중 1kg 당 본제 0.5mL를 복강 또는 근육주사	100mg /1mL	(주)고려비엔피 -	변경
	서울-토코페롤씨 (비타민 E 등)	○ 각종 어류의 비타민 E, C결핍증 예방 및 치료, 성장촉진, 사료효율 개선, 면역력 증강, 항스트레스 효과	○ 경구 -100~500g/사료 톤	-	(주)서울신약 -	변경
소독제	씨바이브 (과탄산나트륨)	○ 병원체의 살멸 및 소독 -일반세균: 일반세균(<i>Salmonella typhimurium</i>) -특정세균: 바리요균(<i>Vibrio anguillarum</i>), 에드워드균(<i>Edwardsiella ictaluri</i>), 연쇄상구균(<i>Streptococcus parauberis</i>) ○ 건조된 수조 및 양식장 수조의 살균 및 소독	부표참조		(주)씨티씨바이오 -	변경