2021년도 하반기 수산용 동물용의약(외)품 품목 허가 · 변경 현황

	제품명	효능 및 효과	용법 및 용량	유 효 성분량	업 체 명 휴약기간	비 고
항생 · 항균제	그린펜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 병원균(에로모나스균, 파스튜렐라균, 비브리오균, 에드와드균, 스크렙토코커스속균)에 의한 세균성 질병의 치료 -연어:절창병, 비브리오병 -방어:유결절증	○ 경구 -어체중 1kg당 본제0.4g(플로페니콜로서 10mg)을 1일량으로 사료에 혼합하여 5일간 투여	25g/kg	㈜알앤엘애니멀헬스 방어:5일 연어:7일	변경
	대성 아쿠아목스 20산 (아목시실린수화물)	○ 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -방어:유결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*)	○ 경구 -어체중 톤당 본제 100~200g(아목시실린으로서 20~40g)을 사료에 균일하게 혼합하여 1일 1~2회 나누어 4~7일간 경구투여	200g(역가)/kg	㈜대성미생물연구소 방어:7일	변경
	린코웰(주) (린코마이신염산염수화물)	○ 린코마이신에 감수성이 있는 아래 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus iniae, S. parauberis*)	○ 주사 -넙치:어체중 1kg당 본제 0.1mL(린코마이신으로서 10mg)을 등근육에 1회 투여	100mg(역가)/mL	우진비앤지㈜ 넙치:30일	신규
	마하마이신 수산용 (염산옥시테트라싸이클린)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):아가미부식병(*Flavobacterium columnare*),비브리오병(*Vibrio anguillarum*)절창병(*Aeromonas salmonicida*),궤양병(*Hemophilus piscium*),세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*),슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -잉어:비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 솔방울병(*Aeromonas hydrophila*) -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*) -메기:세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -뱀장어:지느러미적병(*Aeromonas punctata*) -참돔:비브리오병(*Vibrio anguillarum*)	○ 경구(사료혼합) -송어 아가미부식병:345g/어체중톤,10일 -송어 비브리오병:42~208g/어체중톤,3~7일 -송어 절창병 · 궤양병 · 세균성출혈성패혈증 · 슈도모나스병:230~345g/어체중톤, 10일 -잉어 비브리오병:42~208g/어체중톤, 3~7일 -잉어 솔방울병:208~417g/어체중톤, 5일 -방어 류결절증:125~292g/어체중톤, 5일 -메기 슈도모나스증 · 세균성출혈성패혈증 :203~345g/어체중톤, 10일 -뱀장어 지느러미적병:42~208g/어체중톤, 3~7일 -참돔 비브리오병:42~208g/어체중톤, 3~7일 ○ 약욕 -참돔 비브리오병:104g/물 톤, 30~60분	240g(역가)/kg	㈜고려비엔피 송어:30일 잉어:25일 방어:20일 메기:30일 뱀장어:30일 참돔:20일(약욕시5일)	변경
	비노탈 포르테 아쿠아 (암피실린나트륨)	○ 암피실린에 감수성이 있는 아래의 세균성 질병의 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus iniae, S. parauberis*)	○ 주사 -본제 1g당 주사용수 10mL의 비율로 희석하여 다음의 용량을 1일 1회 등근육주사 넙치:어체중 Kg당 본제 0.2mL(암피실린으로서 20mg)	1g(역가)/g	한국엘랑코동물약품㈜ 넙치:20일	변경
	삼우 린코마이신 아쿠아 주사 (린코마이신염산염수화물)	○ 린코마이신에 감수성이 있는 아래 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus iniae, S. parauberis*)	○ 주사 -넙치:어체중 1kg당 본제 0.1mL(린코마이신으로서 10mg)을 등근육에 1회 투여	100mg(역가)/mL	㈜삼우메디안 넙치:30일	신규
	삼우 아목시실린 주사 (아목시실린나트륨)	○ 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus iniae, S. parauberis*)	○ 주사 -본제 1g(역가)당 주사용수 10mL의 비율로 희석하여 다음 용량을 1일 1회 등근육주사 넙치:어체중 kg당 본제 0.4mL(아목시실린으로서 40mg)	1000mg (역가)/g	㈜삼우메디안 넙치:20일	변경
	삼우 암피실린 주사 (암피실린나트륨)	○ 암피실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus iniae, S. parauberis*)	○ 주사 -본제 1g(역가)당 주사용수 10mL의 비율로 희석하여 다음 용량을 1일 1회 등근육주사 넙치:어체중 kg당 본제 0.2mL(암피실린으로서 20mg)	1000mg (역가)/g	㈜삼우메디안 넙치:20일	변경
	삼우 타일로신 아쿠아 산 (타일로신타르타르산)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus iniae, S. iniae*)	○ 경구 -넙치:어체중 1톤당 본제 100g(타일로신로서 10g)을 사료에 혼합하여 1일 1회 5일간 경구투여	100g(역가)/kg	㈜삼우메디안 넙치:20일	신규
	수산용 네오란-주 (린코마이신염산염수화물)	○ 린코마이신에 감수성이 있는 아래 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus iniae, S. parauberis*)	○ 주사 -넙치:어체중 1kg당 본제 0.1mL(린코마이신으로서 10mg)을 등근육에 1회 투여	100mg(역가)/mL	㈜하나원 넙치:30일	신규

	수산용 네오테트라 (염산옥시테트라싸이클린 등)	○ 옥시테트라사이클린 및 네오마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -뱀장어: 에드워드병(파라콜로병 : *Edwardsiella tarda*)	○ 경구(사료혼합) -일일 어체중 ton 당 본제 60~120g을 사료에 균일하게 혼합하여 7일간 경구 투여 ○ 약욕 -일일 물 ton 당 본제 50~100g을 7일간 약욕, 1시간	부표참조	㈜유니바이오테크 뱀장어:30일	변경
	수산용 삼양 린코 주 (린코마이신염산염수화물)	○ 린코마이신에 감수성이 있는 아래 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus iniae, S. parauberis*)	○ 주사 -넙치:어체중 1kg당 본제 0.1mL(린코마이신으로서 10mg)을 등근육에 1회 투여	1000mg (역가)/g	㈜삼양애니팜 넙치:30일	신규
	수산용 삼양 오.티.씨 24산 (염산옥시테트라싸이클린)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):아가미부식병(*Flavobacterium columnare*),비브리오병(*Vibrio anguillarum*)절창병(*Aeromonas salmonicida*),궤양병(*Hemophilus piscium*),세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*),슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -잉어:비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 솔방울병(*Aeromonas hydrophila*) -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*) -메기:세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -뱀장어:지느러미적병(*Aeromonas punctata*) -참돔:비브리오병(*Vibrio anguillarum*)	○ 경구(사료혼합) -송어 아가미부식병:345g/어체중톤,10일 -송어 비브리오병:42~208g/어체중톤,3~7일 -송어 절창병·궤양병·세균성출혈성패혈증·슈도모나스병:230~345g/어체중톤, 10일 -잉어 비브리오병:42~208g/어체중톤, 3~7일 -잉어 솔방울병:208~417g/어체중톤, 5일 -방어 류결절증:125~292g/어체중톤, 5일 -메기슈도모나스증·세균성출혈성패혈증:203~345g/어체중톤, 10일 -뱀장어 지느러미적병:42~208g/어체중톤, 3~7일 -참돔 비브리오병:42~208g/어체중톤, 3~7일 ○ 약욕 -참돔 비브리오병:104g/물 톤, 30~60분	240g(역가)/kg	㈜삼양애니팜 송어:30일 잉어:25일 방어:20일 메기:30일 뱀장어:30일 참돔:20일 (약욕시 5일)	변경
	수산용 삼양 오티씨-480산 (염산옥시테트라싸이클린)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):아가미부식병(*Flavobacterium columnare*),비브리오병(*Vibrio anguillarum*)절창병(*Aeromonas salmonicida*),궤양병(*Hemophilus piscium*),세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*),슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -잉어:비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 솔방울병(*Aeromonas hydrophila*) -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*) -메기:세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -뱀장어:지느러미적병(*Aeromonas punctata*) -참돔:비브리오병(*Vibrio anguillarum*)	○ 경구(사료혼합) -송어 아가미부식병:172g/어체중톤,10일 -송어 비브리오병:21~104g/어체중톤,3~7일 -송어절창병·궤양병·세균성출혈성패혈증·슈도모나스병:115~172g/어체중톤, 10일 -잉어 비브리오병:21~104g/어체중톤, 3~7일 -잉어 솔방울병:104~208g/어체중톤, 5일 -방어 류결절증:63~146g/어체중톤, 5일 -메기슈도모나스증·세균성출혈성패혈증:115~172g/어체중톤, 10일 -뱀장어 지느러미적병:21~104g/어체중톤, 3~7일 -참돔 비브리오병:21~104g/어체중톤, 3~7일 ○ 약욕 -참돔 비브리오병:52g/물 톤, 30~60분	480g(역가)/kg	㈜삼양애니팜 송어:30일 잉어:25일 방어:20일 메기:30일 뱀장어:30일 참돔:20일 (약욕시 5일)	변경
	수산용 삼양타이로신산 (타일로신타르타르산)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus iniae, S. iniae*)	○ 경구 -넙치:어체중 1톤당 본제 100g(타일로신로서 10g)을 사료에 혼합하여 1일 1회 5일간 경구투여	100g(역가)/kg	㈜삼양애니팜 넙치:20일	신규
	수산용 삼우 암피실린산 (암피실린수화물)	○ 암피실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*)	○ 경구 -일일 어체중 1톤당 본제 50~200g(암피실린으로 5~20g)을 사료에 혼합하여 1일 1~2회 5일간 투여	100g(역가)/kg	㈜삼우메디안 방어:5일	변경
	수산용 삼우 암피실린 산 200g (암피실린수화물)	○ 암피실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*)	○ 경구 -일일 어체중 1톤당 본제 25~100g(암피실린으로 5~20g)을 사료에 혼합하여 1일 1~2회 5일간 투여	200g(역가)/kg	㈜삼우메디안 방어:5일	변경
	수산용 세프론-주 (세프티오퍼나트륨)	○ 세프티오퍼에 감수성이 있는 아래 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus iniae, S. parauberis*)	○ 주사 -본제 1g(역가)당 주사용수 20mL의 비율로 희석하여 다음 용량을 1일 1회 근육주사 넙치:어체중 kg당 본제 0.2mL(세프티오퍼로서 10mg)	1000mg (역가)/g	녹십자수의약품㈜ 넙치:7일	변경
	수산용 세프킹 주 (세프티오퍼나트륨)	○ 세프티오퍼에 감수성이 있는 아래 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus iniae, S. parauberis*)	○ 주사 -본제 1g(역가)당 주사용수 20mL의 비율로 희석하여 다음 용량을 1일 1회 근육주사 넙치:어체중 kg당 본제 0.2mL(세프티오퍼로서 10mg)	1000mg (역가)/g	㈜퓨오바이더스 넙치:7일	변경
	수산용 아목실	○ 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료	○ 경구	200g(역가)/	녹십자수의약품㈜	변경

	200 (아목시실린수화물)	-방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*)	-일일 어체중 1톤당 본제 100~200g(아목시실린으로 20~40g)을 1일 1~2회 나누어 사료에 혼합하여 4~7일간 연속 투여	kg	방어:7일	
	수산용 아목실-주 (아목시실린수화물)	○ 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus iniae, S. parauberis*)	○ 주사 - 본제 1g(역가)당 주사용수 10mL의 비율로 희석하여 다음의 용량을 1일 1회 근육주사 넙치:어체중 kg당 본제 0.4mL(아목시실린으로서 40mg)	1000mg (역가)/g	녹십자수의약품㈜ 넙치:20일	
	수산용 애니헬 에리설프 (에리트로마이신 등)	○ 에리트로마이신, 설파디아진 및 트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):연쇄구균증(*Streptococcus* sp), 비브리오병(*Vibrio ordalii*), 절창병(*Aeromonas salmonicida*),세균성신장병(*Renibacterium salmoninarum*),세균성아가미병(*Flavobacterium blanchiphilum*) -방어:연쇄구균증(*Lactococcus garvieae*), 비브리오병(*Vibrio anguillarum*) -넙치:에드워드병(*Edwardsiella tarda*), 연쇄구균증(*Streptococcus* sp),비브리오병(*Vibrio anguillarum*) -조피볼락:연쇄구균증(*Streptococcus* sp),비브리오병(*Vibrio ordalii*) -뱀장어:아가미부식병(*Flavobacterium columnare*),연쇄구균증(*Streptococcus* sp), 비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 궤양병(*Aeromonas salmonicida*),적점병(*Pseudomonas aguilloeptica*)	○ 경구 -어체중 1톤당 본제 100~200g을 사료에 균일하게 혼합하여 2~5일간 경구 투여	부표참조	제이비동물약품㈜ 30일	변경
	수산용 애드 아목실더블 산 (아목시실린수화물)	○ 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*)	○ 경구 -어체중 1톤당 본제 100~200g(아목시실린으로 20~40g)을 사료에 균일하게 혼합하여1일 1~2회 나누어 4~7일간 경구 투여	200g(역가) /kg	㈜애드바이오텍 방어:7일	변경
	수산용 에리스로 산 (에리스로마이신)	○ 에리트로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):세균성신장병(*Renibacterium salmoninarum*),연쇄구균증(*Streptococcus* spp.) -방어:연쇄구균증(*Lactococcus garvieae*)	○ 경구 -세균성신장병:어체중 1톤당 본제200~500g/일(에리트로마이신으로서 40~100g역가)을 사료에 혼합하여 21일간 투여 -연쇄구균증: 어체중 1톤당 본제 125~200g/일(에리트로마이신으로서 25~40g역가)을 사료에 혼합하여 5일간 경구투여.	200g(역가) /kg	㈜삼우메디안 연어과 어류(송어):30일 방어 :14일	변경
	수산용 엔푸록신-200산 (엔로플록사신)	○ 엔로플록사신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus parauberis*) -조피볼락:연쇄구균증(*Streptococcus iniae*), 에로모나스증(*Aeromonas salmonicida*)	○ 경구 -넙치,조피볼락:어체중 1톤당 본제 50g(엔로플록사신으로 10g)를 사료에 혼합하여 1일 1회 7일간 경구투여	200g/1kg	진우약품㈜ 넙치:90일 조피볼락:80일	신규
	수산용 옥시-50 아쿠아 (염산옥시테트라싸이클린)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):아가미부식병(*Flavobacterium columnare*),비브리오병(*Vibrio anguillarum*)절창병(*Aeromonas salmonicida*),궤양병(*Hemophilus piscium*),세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*),슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -잉어:비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 솔방울병(*Aeromonas hydrophila*) -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*) -메기:세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -뱀장어:지느러미적병(*Aeromonas punctata*) -참돔:비브리오병(*Vibrio anguillarum*)	○ 경구(사료혼합) -송어 아가미부식병:165g/어체중톤,10일 -송어 비브리오병:20~100g/어체중톤,3~7일 -송어 절창병·궤양병·세균성출혈성패혈증·슈도모나스병:110~165g/어체중톤, 10일 -잉어 비브리오병:20~100g/어체중톤, 3~7일 -잉어 솔방울병:100~200g/어체중톤, 5일 -방어 류결절증:60~140g/어체중톤, 5일 -메기슈도모나스증·세균성출혈성패혈증:110~165g/어체중톤, 10일 -뱀장어 지느러미적병:20~100g/어체중톤, 3~7일 -참돔 비브리오병:20~100g/어체중톤, 3~7일 ○ 약욕 -참돔 비브리오병:50g/물 톤, 30~60분	500g(역가) /kg	㈜삼우메디안 송어:30일 잉어:25일 방어:20일 메기:30일 뱀장어:30일 참돔:20일 (약욕시 5일)	변경
	수산용 옥시마이신 아쿠아 (염산옥시테트라싸이클린)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):아가미부식병(*Flavobacterium columnare*),비브리오병(*Vibrio anguillarum*)절창병(*Aeromonas salmonicida*),궤양병(*Hemophilus piscium*),세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*),슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -잉어:비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 솔방울병(*Aeromonas hydrophila*) -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*)	○ 경구(사료혼합) -송어 아가미부식병:345g/어체중톤,10일 -송어 비브리오병:42~208g/어체중톤,3~7일 -송어 절창병·궤양병·세균성출혈성패혈증·슈도모나스병:230~345g/어체중톤, 10일 -잉어 비브리오병:42~208g/어체중톤, 3~7일 -잉어 솔방울병:208~417g/어체중톤, 5일 -방어 류결절증:125~292g/어체중톤, 5일 -메기슈도모나스증·세균성출혈성패혈증:203~345g/어체중톤, 10일	240g(역가) /kg	㈜삼우메디안 송어:30일 잉어:25일 방어:20일 메기:30일 뱀장어:30일 참돔:20일 (약욕시 5일)	변경

		-메기:세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -뱀장어:지느러미적병(*Aeromonas punctata*) -참돔:비브리오병(*Vibrio anguillarum*)	-뱀장어 지느러미적병:42~208g/어체중톤, 3~7일 -참돔 비브리오병:42~208g/어체중톤, 3~7일 ○ 약욕 -참돔 비브리오병:104g/물 톤, 30~60분			
수산용 타일로피쉬 산 (타일로신타르타르산)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus parauberis S. iniae*)	○ 경구 -넙치:어체중 1톤당 본제 100g(타일로 신으로서 10g)을 사료에 혼합하여 1일 1 회 5일간 경구투여	100g(역가)/kg	㈜한동 넙치:20일	신규
수산용 펄목시 200산 (아목시실린수화물)	○ 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*)	○ 경구 -일일 어체중 톤당 본제 100~200g(아목시실린으로서 20~40g)을 사료에 균일하게 혼합하여 1일 1~2회 4~7일간 경구투여	200g(역가)/kg	㈜중앙바이오텍 방어:7일	변경
수산용 페니솔 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병 (*Edwardsiella tarda*),연쇄상구균증(*Streptococcus iniae*)	○ 경구 -넙치:어체중 1톤당 본제 50mL(플로르페니콜로서 10g)을 사료에 혼합하여 1일 1회 5일간 경구 투여	200g(역가)/L	㈜참신홀딩스 넙치:21일	변경
수산용 페니콜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병 (*Edwardsiella tarda*), 연쇄상구균증(*Streptococcus iniae*)	○ 경구 -넙치:어체중 1톤당 본제 400g(플로르페니콜로서 10g)을 사료에 혼합하여 1일 1회 5일간 경구 투여	25g/kg	㈜참신홀딩스 넙치:21일	변경
아목시 50 아쿠아 (아목시실린수화물)	○ 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*)	○ 경구 -어체중 톤당 본제 40~80g(아목시실린으로서 20~40g)을 사료에 균일하게 혼합하여 1일 1~2회 나누어 4~7일간 경구투여	500g(역가)/kg	㈜삼우메디안 방어:7일	변경
아목시 아쿠아 (아목시실린수화물)	○ 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*)	○ 경구 -어체중 톤당 본제 67~133g(아목시실린으로서 20~40g)을 사료에 균일하게 혼합하여 1일 1~2회 나누어 4~7일간 경구투여	300g(역가)/kg	㈜삼우메디안 방어:7일	변경
아쿠아 옥소린-200(산) (옥소린산)	○ 옥소린산에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어,연어:비브리오병(*Vibrio anguillarum*),절창병(*Aeromonas salmonicida*), -잉어:에로모나스병(*Aeromonas spp.*) -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*) -은어:비브리오병(*Vibrio anguillarum*) -뱀장어:에드워드병(*Edwardsiella tarda*), 에로모나스병(*Aeromonas hydrophila*), 적점병(*Pseudomonas anguilliseptica*)	○ 경구(사료혼합) -송어,연어 비브리오병:25~100g/어체중톤,3-5일 -송어,연어 절창병:25-50g/어체중톤,5-7일 -방어 류결절증:50~100g/어체중톤, 5일 -뱀장어에드워드병:25~100g/어체중톤,5~7일 -뱀장어에로모나스병:25~100g/어체중톤,4-6일 -뱀장어 적점병:5-25g/어체중톤,3-5일간 -은어 비브리오병:25~100g/어체중톤,3-7일 -잉어 에로모나스병:25~50g/에체중톤,5~7	200g/kg	진우약품㈜ 송어,연어:21일 방어:16일 뱀장어:25일 은어:14일 잉어:28일	신규
아쿠아 울트라 분말 (염산옥시테트라싸이클린)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):아가미부식병(*Flavobacterium columnare*),비브리오병(*Vibrio anguillarum*)절창병(*Aeromonas salmonicida*),궤양병(*Hemophilus piscium*),세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*),슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -잉어:비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 솔방울병(*Aeromonas hydrophila*) -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*) -메기:세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -뱀장어:지느러미적병(*Aeromonas punctata*) -참돔:비브리오병(*Vibrio anguillarum*)	○ 경구(사료혼합) -송어 아가미부식병:276g/어체중톤,10일 -송어 비브리오병:33~167g/어체중톤,3~7일 -송어 절창병·궤양병·세균성출혈성패혈증·슈도모나스병:184~276g/어체중톤, 10일 -잉어 비브리오병:33~167g/어체중톤, 3~7일 -잉어 솔방울병:167~333g/어체중톤, 5일 -방어 류결절증:100~233g/어체중톤, 5일 -메기 슈도모나스증·세균성출혈성패혈증:184~276g/어체중톤, 10일 -뱀장어 지느러미적병:33~167g/어체중톤, 3~7일 -참돔 비브리오병:33~167g/어체중톤, 3~7일 ○ 약욕 -참돔 비브리오병:83g/물 톤, 30~60분	300g(역가)/kg	한국엘랑코동물약품㈜ 송어:30일 잉어:25일 방어:20일 메기:30일 뱀장어:30일 참돔:20일 (약욕시 5일)	변경
아쿠아-플로콜 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병 (*Edwardsiella tarda*), 연쇄상구균증(*Streptococcus iniae*)	○ 경구 -넙치:어체중 1톤당 본제 400g(플로르페니콜로서 10g)을 사료에 혼합하여 1일 1회 5일간 경구투여	25g/kg	㈜에스에프 넙치:21일	변경
에리·에스 아쿠아 (에리트로마이신 등)	○ 에리트로마이신, 설파디아진 및 트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):세균성신장병(*Renibacterium salmoninarum*) -방어:연쇄구균증(*Lactococcus garvieae*), 비브리오병(*Vibrio anguillarum*) -넙치:연쇄구균증(*Streptococcus* sp),비브리오병(*Vibrio anguillarum*)	○ 경구 -어체중 1톤당 본제 62.5~175g/일을 1일 2회로 나누어 사료에 고르게 혼합하여 5-7일간 경구투여	부표참조	㈜삼우메디안 30일	변경

		-조피볼락:연쇄구균증(*Streptococcus* sp),비브리오병(*Vibrio ordalii*) -뱀장어:기적병(지느러미적병,*Aeromonas hydrophila*), 에드워드병(*Edwardsiella tarda*), 연쇄구균증(*Streptococcus sp.*)				
	유니설파 500 (설파디메톡신 나트륨)	○ 설파디메톡신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -무지개송어: 절창병(*Aeromonas salmonicida*)	○ 경구 -무지개송어:어체중 1톤당 본제200g(설파디메톡신으로 100g)을 사료에 혼합하여 1일 1회 7일간 경구투여	500g/kg	㈜유니바이오테크 무지개송어:30일	변경
	진우 수산용 오티씨-500 (염산옥시테트라싸이클린)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):아가미부식병(*Flavobacterium columnare*),비브리오병(*Vibrio anguillarum*)절창병(*Aeromonas salmonicida*),궤양병(*Hemophilus piscium*),세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*),슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -잉어:비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 솔방울병(*Aeromonas hydrophila*) -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*) -메기:세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -뱀장어:지느러미적병(*Aeromonas punctata*) -참돔:비브리오병(*Vibrio anguillarum*)	○ 경구(사료혼합) -송어 아가미부식병:165g/어체중톤,10일 -송어 비브리오병:20~100g/어체중톤,3~7일 -송어 절창병·궤양병·세균성출혈성패혈증·슈도모나스병:110~165g/어체중톤, 10일 -잉어 비브리오병:20~100g/어체중톤, 3~7일 -잉어 솔방울병:100~200g/어체중톤, 5일 -방어 류결절증:60~140g/어체중톤, 5일 -메기 슈도모나스증·세균성출혈성패혈증:110~165g/어체중톤, 10일 -뱀장어 지느러미적병:20~100g/어체중톤, 3~7일 -참돔 비브리오병:20~100g/어체중톤, 3~7일 ○ 약욕 -참돔 비브리오병:50g/물 톤, 30~60분	500g(역가)/kg	진우약품㈜ 송어:30일 잉어:25일 방어:20일 메기:30일 뱀장어:30일 참돔:20일 (약욕시 5일)	변경
	플로르맥스-아쿠아 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:에드워드병 (*Edwardsiella tarda*), 연쇄상구균증(*Streptococcus iniae*)	○ 경구 -넙치:어체중 1톤당 100mL(플로르페니콜로서 10g)를 사료에 혼합하여 1일 1회 5일간 경구투여	100g/L	㈜제일바이오 넙치:21일	변경
	하이타이로100산 (타일로신타르타르산)	○ 타일로신에 감수성이 있는 세균성 질병 치료 -넙치:연쇄구균증(Streptococcus parauberis S. iniae)	○ 경구 -넙치:어체중 1톤당 본제 100g(타일로신으로서 10g)을 사료에 혼합하여 1일 1회 5일간 경구투여	100g(역가)/kg	㈜다원케미칼 넙치:20일	신규
	휘쉬 네오 (네오마이신황산염)	○ 네오마이신에 감수성이 있는 에드워드(*Edwardsiella spp.*), 에로모나스 (*Aeromonas spp.*),비브리오(*Vibrio spp.*)에 의한 어류질병의 예방 및 치료. -뱀장어:기적병, 에드워드 감염증 -은어:에드워드병, 에어로모나스 감염증 -송어:비브리오병 -잉어:전염성 복수증	○ 경구 -사료 1톤당 본제 28㎏을 1일 사료에 혼합하여 투여 ○ 약욕 -물 1톤 당 2.8㎏을 용해하여 6시간 약욕하고 48시간 후 재약욕	50g(역가)/kg	㈜유니바이오테크 뱀장어,은어 송어,잉어 5일	변경
	휘쉬 아목시 파워 200 (아목시실린수화물)	○ 아목시실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*)	○ 경구 -어체중 톤당 본제 100~200g(아목시실린으로서 20~40g)을 사료에 균일하게 혼합하여 1일 1~2회 나누어 4~7일간 경구투여	200g(역가)/kg	㈜유니바이오테크 방어:7일	변경
	휘쉬 옥시-500 (염산옥시테트라싸이클린)	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):아가미부식병(*Flavobacterium columnare*),비브리오병(*Vibrio anguillarum*)절창병(*Aeromonas salmonicida*),궤양병(*Hemophilus piscium*),세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*),슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -잉어:비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 솔방울병(*Aeromonas hydrophila*) -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*) -메기:세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -뱀장어:지느러미적병(*Aeromonas punctata*) -참돔:비브리오병(*Vibrio anguillarum*)	○ 경구(사료혼합) -송어 아가미부식병:165g/어체중톤,10일 -송어 비브리오병:20~100g/어체중톤,3~7일 -송어 절창병·궤양병·세균성출혈성패혈증·슈도모나스병:110~165g/어체중톤, 10일 -잉어 비브리오병:20~100g/어체중톤, 3~7일 -잉어 솔방울병:100~200g/어체중톤, 5일 -방어 류결절증:60~140g/어체중톤, 5일 -메기 슈도모나스증·세균성출혈성패혈증:110~165g/어체중톤, 10일 -뱀장어 지느러미적병:20~100g/어체중톤, 3~7일 -참돔 비브리오병:20~100g/어체중톤, 3~7일 ○ 약욕 -참돔 비브리오병:50g/물 톤, 30~60분	500g(역가)/kg	㈜유니바이오테크 송어:30일 잉어:25일 방어:20일 메기:30일 뱀장어:30일 참돔:20일 (약욕시 5일)	변경
	휘쉬스로 썰파 (에리트로마이신 등)	○ 에리트로마이신, 설파디아진 및 트리메토프림 합제에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):연쇄구균증(*Streptococcus* sp), 비브리오병(*Vibrio ordalii*), 절창병(*Aeromonas salmonicida*),세균성신장병(*Renibacterium salmoninarum*),부식병(*Flavobacterium blanchiphilum*)	○ 경구 - 어체중 1ton 당 본제 100~200g을 사료에 고르게 혼합하여 2~5일간 경구투여	부표참조	㈜유니바이오테크 송어(연어과어류) 방어·뱀장어:30일	변경

		-방어:연쇄구균증(*Lactococcus garvieae*), 비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*) -넙치:에드워드병(*Edwardsiella tarda*), 연쇄구균증(*Streptococcus* sp),비브리오병(*Vibrio anguillarum*) -뱀장어:에드워드병(*Edwardsiella tarda*), 비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 기적병(*Aeromonas hydrophila*))				
	휘쉬스로 에스 (에리트로마이신)	○ 에리트로마이신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료. -연어과어류(송어):세균성신장병(*Renibacterium salmoninarum*),연쇄상구균증(*Streptococcuccus sp.*) -방어: 연쇄구균증(*Lactococcus garvieae*)	○ 경구 -세균성신장병:어체중 1ton 당 본제 200~500g/일(에리트로마이신으로서 40~100g 역가)을 사료에 혼합하여 21일간 경구투여 -연쇄구균증:어체중 1ton 당 본제 125~200g/일(에리트로마이신으로서 25~40g 역가)을 사료에 혼합하여 5일간 경구투여	200g(역가)/kg	㈜유니바이오테크 연어과 어류(송어):30일 방어:14일	변경
	휘쉬 암피 (암피실린수화물)	○ 암피실린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -방어:류결절증(*Photobacterium damselae subsp. piscicida*)	○ 경구 -일일 어체중 톤당 본제 50~200g(암피실린으로서 5~20g)을 사료에 균일하게 혼합하여 1일 1~2회 5일간 경구투여	100g(역가)/kg	㈜유니바이오테크 방어:5일	변경
	휘쉬-옥피파워 (염산옥시테트라싸이클린	○ 옥시테트라사이클린에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료 -송어(연어과어류):아가미부식병(*Flavobacterium columnare*),비브리오병(*Vibrio anguillarum*)절창병(*Aeromonas salmonicida*),궤양병(*Hemophilus piscium*),세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*),슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -잉어:비브리오병(*Vibrio anguillarum*), 솔방울병(*Aeromonas hydrophila*) -방어:류결절증(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*) -메기:세균성출혈성패혈증(*Aeromonas liquefaciens*), 슈도모나스병(*Pseudomonas sp.*) -뱀장어:지느러미적병(*Aeromonas punctata*) -참돔:비브리오병(*Vibrio anguillarum*)	○ 경구(사료혼합) -송어 아가미부식병:345g/어체중톤,10일 -송어 비브리오병:42~208g/어체중톤,3~7일 -송어 절창병·궤양병·세균성출혈성패혈증·슈도모나스병:230~345g/어체중톤, 10일 -잉어 비브리오병:42~208g/어체중톤, 3~7일 -잉어 솔방울병:208~417g/어체중톤, 5일 -방어 류결절증:125~292g/어체중톤, 5일 -메기슈도모나스증·세균성출혈성패혈증:203~345g/어체중톤, 10일 -뱀장어 지느러미적병:42~208g/어체중톤, 3~7일 -참돔 비브리오병:42~208g/어체중톤, 3~7일 ○ 약욕 -참돔 비브리오병:104g/물 톤, 30~60분	240g(역가)/kg	㈜유니바이오테크 송어:30일 잉어:25일 방어:20일 메기:30일 뱀장어:30일 참돔:20일 (약욕시 5일)	변경
	휘쉬 치암 (수출용)	○ 방어의 류결절증, 비브리오 감염증, 절창병의 치료	○경구 -물고기 체중 1 ton당 200~500g을 사료에 혼합하여 5~7일간 투여한다.	100g/kg	㈜유니바이오테크 15일	변경
	휘쉬플로 100 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 병원균(에로모나스균, 파스튜렐라균, 비브리오균, 에드와드균, 스크렙토코커스속균)에 의한 세균성 질병의 치료 -송어·연어: 절창병, 비브리오병 -방어: 연쇄구균증,유결절증 -뱀장어:에드와드병	○경구 -1일 어체중 톤 당 본제 100mL(플로르페니콜로서 10g)를 사료에 골고루 혼합하여 5일간 경구투여	100g/L	㈜유니바이오테크 방어:5일 뱀장어:7일 송어,연어:14일	변경
	휘쉬플로 200 (플로르페니콜)	○ 플로르페니콜에 감수성이 있는 병원균(에로모나스균, 파스튜렐라균, 비브리오균, 에드와드균, 스크렙토코커스속균)에 의한 세균성 질병의 치료 -송어·연어: 절창병, 비브리오병 -방어: 연쇄구균증, 유결절증 -뱀장어:에드와드병	○경구 -1일 어체중 톤 당 본제 50mL(플로르페니콜로서 10g)를 사료에 골고루 혼합하여 5일간 경구투여	200g/L	㈜유니바이오테크 방어:5일 뱀장어:7일 송어,연어:14일	변경
대사·소화기계 작용약	더배로 주 (부타포스판 등)	○ 넙치 -사료효율 개선, 신진대사 및 증체 개선, 활력 증진, 폐사율 감소, 스트레스 시 저항력 증진, 면역증강	○ 주사 -어체중 1kg당 본제 0.1~0.5ml를 근육주사	100mg/ml	에스비시일㈜	변경
	수산용 누비존-C (비타민 C)	○ 어류에 비타민 C의 공급 및 결핍증의 개선효과, 면역력 증강, 항스트레스 효과, 성장촉진, 사료효율 개선	○ 경구 -양어용 사료 톤당 500mL~1.5L를 첨가 하여 사용	100g/L	㈜서울신약	신규
	수산용 누비존-EC (비타민 E 등)	○ 어류에 비타민 E, C의 공급 및 결핍증의 개선효과, 면역력 증강, 항스트레스 효과, 성장촉진, 사료효율 개선	○ 경구 -양어용 사료 톤당 500mL~1000mL를 혼합하여 급여	부표참조	㈜서울신약	신규

	수산용 리버헬스 (글루타치온)	○ 양식어류의 간기능 장애 개선 및 항병력 증가	○ 경구 -어체중 톤당 본제 0.5-1kg (글루타치온으로서 10-20g)을 1일량으로 사료에 혼합 투여	20g/kg	녹십자수의약품㈜	변경
	아도모-피쉬 (글루타치온)	○ 방어 -사료성 간장 장애의 개선, 생존율 향상 및 항병력 증진, 면역력 증강	○ 경구 -어체중 1kg당 본제 0.5～1g(글루타치온으로서 20mg)을 1일량으로 사료에 혼합하여 경구 투여한다.	20g/kg	㈜한동	변경
	아쿠아 비스라제 L산	○ 세균성설사의 예방 및 치료, 소화불량에의한 설사의 예방과 치료, 소화율 증진,사료효율 개선, 발육촉진, 정장, 수질오염방지	○ 경구 -뱀장어:사료 1톤당 본제 1~5kg을 균등히 혼합하여 투여	부표참조	㈜삼양애니팜	변경
	진우 글루타치온 (글루타치온)	○ 양식어류의 간장기능 장애 개선 및 생존율향상, 성장촉진, 면역력증강, 항병력증진	○ 경구 -어체중 톤당 본제 0.5~1kg을 1일량으로 사료에 혼합하여 투여	20g/kg	진우약품(주)	변경
	푸른바다 씨이신 (비타민 C등)	○ 어류의 항병력 증강, 사료효율개선, 성장촉진, 등여윔병의 예방 및 치료, 사료산화방지, 수정율·부화율의 향상, 황색지방증의 예방, 면역력 증강	○ 경구 -사료에 0.1~0.3%(사료 톤당 본제로 1kg~3kg)을 균일하게 혼합 투여	부표참조	제이비동물약품(주)	변경
	DH아쿠아 루치온 주 (글루타치온)	○ 넙치 -간 기능 개선, 각종 스트레스 완화	○ 주사 -넙치 : 본제를 주사용수 6mL에 용해시켜 어체중 1kg 당 0.1mL(글루타티온으로써 10 mg)를 1일 1회, 1일간 근육 주사	600mg/vial	대한뉴팜(주)	변경
구충제	삼양 하이드로 액 (과산화수소)	○ 넙치:스쿠티카충(*Scuticociliatida*)의 구제	○ 넙치: 약욕 시 물 1톤당 본제 100~200㎖를 혼합하여 1시간 약욕(필요시 3일 후 1회 반복투여) 배출기준: 처리 용수의 20배 이상 희석하여 배출	350g/L	㈜삼양애니팜 3일	신규
	스쿠말린액 (포르말린)	○ 넙치: 외부기생성 원충류(*Ichthyobodo sp., Scuticociliatida*)의 구제 ○ 어란(무지개 송어 및 연어):수생균(*Saprolegnia sp.*) 구제	○ 넙치: 약욕시 물 1톤당 본제 100~200㎖을 1시간 약욕(*Scuticociliatida* 감염은 3~4일 연속 투여, 20배이상 희석하여 배출) ○ 어란: 약욕시 물 1톤당 본제 1000~2000㎖을 15분 약욕(200배이상 희석하여 배출)	999㎖/L	㈜삼양애니팜 100도일(degree day= 100/수온℃)	변경
	아쿠아마린 (포름말린)	○ 넙치: 외부기생성 원충류(*Ichthyobodo sp., Scuticociliatida*)의 구제 ○ 어란(무지개 송어 및 연어):수생균(*Saprolegnia sp.*) 구제	○ 넙치:약욕시 물 1톤당 본제 100~200㎖을 1시간 약욕(*Scuticociliatida* 감염은 3~4일 연속 투여, 20배이상 희석하여 배출) ○ 어란: 약욕시 물 1톤당 본제 1000~2000㎖을 15분 약욕(200배이상 희석하여 배출)	999㎖/L	녹십자수의약품㈜ 100도일(degree day= 100/수온℃)	변경
	아쿠아프로액 (과산화수소)	○ 넙치:스쿠티카충(*Scuticociliatida*)의 구제	○ 넙치:약욕 시 물 1톤당 본제 100~200㎖를 혼합하여 1시간 약욕(필요시 3일 후 1회 반복투여) 배출기준: 처리 용수의 20배 이상 희석하여 배출	350g/L	㈜하나원 3일	신규
	이화 프라텔액 (프라지콴텔)	○ 조피볼락:아가미흡충증(*Microcotyle sebastis*)의 치료	○ 경구 -어체중 kg당 본제 1~2mL를 사료에 혼합하여 2일 간격으로 1~3회 경구투여 ○ 약욕 -물 1L당 본제 0.5~1mL를 잘 용해한 약물에 대상 어류를 4분간 약욕	100g/L	이화팜텍㈜ 조피볼락(우럭) 10일	변경
	포름-에이 (포름알데하이드)	○ 넙치: 외부기생성 원충류(*Ichthyobodo sp., Scuticociliatida*)의 구제 ○ 어란(무지개 송어 및 연어):수생균(*Saprolegnia sp.*) 구제	○ 넙치:약욕시 물 1톤당 본제 100~200㎖을 1시간 약욕(*Scuticociliatida* 감염은 3~4일 연속 투여, 20배이상 희석하여 배출) ○ 어란: 약욕시 물 1톤당 본제 1000~2000㎖을 15분 약욕(200배이상 희석하여 배출)	999㎖/L	㈜삼우메디안 100도일(degree day= 100/수온℃)	변경
백신	이뮤니스 메가백	○ 참돔 이리도바이러스(RSIV) 감염의 예방 및 발 생 경감을 목적으로 사용한다.	○ 대상 어종 돌돔 (*Oplegnathus fasciatus*) ○ 접종 대상의 크기 : 10g 이상 ○ 접종부위 및 접종량 : 어체 1마리당 0.1mL씩 복강 접종	부표참조	우진비앤지㈜	신규
	참신 하이파이브	○ 넙치의 비브리오 감염증(*Vibrio harveyi*), 에드와드 감염증(*Edwardsiella tarda*) 및 연쇄구균 감염증(*Streptococcus iniae, Streptococcus parauberis serotype* Ia, Ib) 예방 및 병증 경감을 목적으로 사용한다.	○ 접종 대상:평균 체장 10cm 이상의 건강한 넙치 ○ 접종부위 및 접종량 :건강한 넙치의 가슴지느러미와 배지느러미 사이의 복강에 0.1㎖씩 접종한다.	부표참조	㈜중앙백신연구소	신규
소독제	다원 올킬 아쿠아 (포타슘모노퍼설페이트)	○ 본제에 감수성이 있는 병인체의 살멸 및 소독 -세균:일반세균(*Salmonella typhimurium*),특정세균:비브리오균(*Vibrio anguilarum*),연쇄상구균 (*Lactococcus garviae*) -바이러스:바이러스성 출혈성 패혈증 바이러스 (VHSV, Viral hemorrhagic septicemia virus)	부표참조	부표참조	㈜다원케미칼	변경

		-양식장기구, 일반차량, 산소공급장치, 양식장수조 배관, 뜰채, 그물, 물차의 소독 및 살균				
	수산용 포비딘 (포비돈 요오드)	○ 전염성췌장괴사증(IPN), 전염성조혈기괴사증(INH),바이러스성출혈성패혈증(VHS),절창병, 비브리오병 및 세균성신장병 등 어류 질병 예방을 위한 어란소독	○ 어란(魚卵) 소독 -물 1L에 본제 5mL를 희석하여 30분간 소독 -물 1L에 본제 10mL를 희석하여 10분간 소독	100mg/ml	㈜삼양애니팜	변경
	아쿠아 닥터 (황산구리수화물)	○ 본제에 감수성이 있는 병인체의 살균 및 소독 -세균:일반세균(*Salmonella typhimurium*),*Aeromonas hydrophila, Vibrio anguillarum, Edwardsiella tarda, Flexibacter maritimus, Streptococcus parauberis, Streptococcus iniae.* -바이러스 : 바이러스성신경괴사증 β-노다바이러스 -기생충 : Scuticociliatosis pathogen ○ 건조된 수조 및 양식장수조 소독	부표참조	부표참조	㈜소프트아쿠아	변경
	참신 칼키 정 (차아염소산칼슘)	○ 본제에 감수성이 있는 병원체의 살멸 및 소독 -세균:일반세균(Salmonella typhimurium), 새우 급성간췌장괴사증 원인체(Vibrio parahaemolyticus), ○ 건조된 수조, 양식장 건조된 수조, 배관, 뜰채, 그물, 물차 등의 살균 및 소독	부표참조	14g/정	㈜참신홀딩스	변경
	클로이-아쿠아 (이산화염소)	○ 본제에 감수성이 있는 병원체의 살멸 및 소독 -양식장내 잔존 병원성 미생물의 제거 -어류 병원성 미생물의 살균 -*Aeromonas hydrophila, Edwardsiella tarda, Streptococcus parauberis, Streptococcus iniae*, Viral haemorrhagic septicaemia virus 등 유해 미생물의 증식억제	부표참조	1g/L	㈜알앤엘애니멀헬스	변경